

# MAXI-GROW®

Promotor de Desarrollo para Aplicación Foliar

## Composición

	g/l
Combinación de extractos de origen orgánico	112.50
Nitrógeno (N)	6.60
Fósforo (P2O5)	13.30
Potasio (K2O)	13.30
Calcio (Ca)	2.00
Magnesio (Mg)	4.00
Hierro (Fe)	17.20
Zinc (Zn)	26.50
Manganeso (Mn)	13.30
Cobre (Cu)	13.30

## Compatibilidad

Maxi-Grow Excel es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común. Es recomendable hacer una prueba de compatibilidad, cuando existan dudas al mezclarlo con algún agroquímico.



## Información general

Maxi-Grow Excel es un promotor de desarrollo de origen natural que contiene incentivos de crecimiento balanceados además de micronutrientes en forma quelatada. Todos estos componentes interactúan sobre los procesos metabólicos de las plantas, pudiendo favorecer incrementos en las cosechas.

En general es muy conveniente aplicar la combinación de Maxi-Grow Excel con Humifert poco antes de la etapa de floración y luego con Agro-K durante el desarrollo del fruto.

## Observaciones

Algunas funciones de Maxi-Grow Excel son las siguientes:

- Promover el crecimiento vigoroso de las plantas.
- Impartir resistencia a las plantas para enfrentar condiciones adversas.
- Estimular la producción de flores y cuaje de frutos.
- Promover el incremento de tamaño y calidad de los frutos.
- Aumentar la calidad y el tiempo de vida de los frutos después de la cosecha.



# MAXI-GROW®

## Recomendaciones

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA Y NÚMERO DE APLICACIONES
Tomate, pimiento, berenjena	250 cc / 100 l.	1) Inicio de floración. 2) Cuaje de frutos. 3) Dos semanas después.
Melón, pepino, calabaza, sandía	250 cc / 100 l.	1) Inicio de floración. 2) Cuaje de frutos. 3) Al cambio de color del fruto.
Papa	500 cc / Ha.	1) Inicio de la tuberización. 2) Un mes después.
Algodón	300 cc / Ha.	Tres aplicaciones con intervalo semanal, a partir del inicio de formación de los capullos.
Cítricos	150 cc / 100 l.	1) Prefloración. 2) Caída de pétalos. 3) Durante el desarrollo del fruto.
Manzano, ciruelo, peral, durazno y nogal	150 cc / 100 l.	1) Floración. 2) Cuaje de frutos. 3) De dos a tres semanas después.
Uva de mesa	2 l. / 1000 l.	Dos aplicaciones por ciclo combinadas con las aplicaciones de Giberélico.
Kiwi	1 l./Ha.	Dos aplicaciones por ciclo, en fruto cuajado y un mes después.
Flores de corte	500 cc/Ha.	Aplicaciones cada 15 días luego de la poda.
Ornamentales	100 cc / 100 l.	En desarrollo vegetativo y floración.

### Recomendaciones particulares

---

---

---

---



diseño Patricia Ruiz

**Cosmoflor**  
LA SOLUCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN

Informes: Calle de la Semillería 1315 - (5012) Córdoba - ARGENTINA  
Telefax +54 (351) 496-2200 - info@cosmoflor.com.ar - www.cosmoflor.com.ar